Les moyens de prévention

Je travaille au contact de bovins

Je mets en place des pratiques professionnelles adaptées et des mesures d'hygiène élémentaires :

1. Hygiène vestimentaire

- Je porte une tenue vestimentaire appropriée et réservée au travail
- Je nettoie régulièrement ma tenue de travail
- J'utilise une armoire vestiaire à double compartiment pour les vêtements de ville et de travail

2. Hygiène individuelle indispensable

- Je me lave les mains après la manipulation des animaux
- Je me lave les mains avant de boire, manger ou fumer
- Je prends une douche en fin de journée de travail
- En cas de plaie, je la nettoie au savon, je la désinfecte et je la protège avec un pansement imperméable. En cas de plaie grave, j'appelle le 15

3. Port de gants

- Je systématise le port de gants en cuir pour tout contact avec les animaux
- J'utilise des gants imperméables pour les travaux d'entretien, pour la manipulation des déchets animaux et des cadavres
- Je porte des gants jetables pour les soins (pansements, piqûres, application de produits vétérinaires…)
- Je pense à mettre impérativement des gants en cas de lésions même minimes au niveau des mains

4. Port de masque respiratoire FFP2

- Je porte un masque au contact d'un animal mort

Dans tous les cas, je respecte les consignes de sécurité de l'entreprise !

Plus d'informations sur : **www.msa-idf.fr**

MSA Ile-de-France
BP 137 — Tél. : 01 30 63 88 90
75664 Paris cedex 14 — Fax : 01 49 85 53 90
www.msa-idf.fr — contact.entreprise@msa75.msa.fr

msa santé famille retraite services
L'essentiel & plus encore

Réalisation : PAO-Communication MSA IdF - Crédit photo : MSA IdF - Illustrations : Natacha BIGAN - Impression : Lecaux imprimerie - 01/2012.

Santé - Sécurité au travail

> Les Zoonoses en élevage

Les zoonoses
des bovins

MSA Ile-de-France



ON PEUT ÊTRE FORT COMME UN BOEUF ET PORTER UN EPI

www.msa-idf.fr

msa santé famille retraite services
L'essentiel & plus encore

Principales zoonoses transmises par les bovins

Nom de la maladie	Type de maladie *Agent pathogène*	Mode de transmission	Signes de la maladie chez l'homme
Teigne	Champignon : *Microsporum ou Trichophyton*	Contamination par contact cutané avec les animaux ou avec des éléments souillés	• Durée d'incubation : une semaine • Symptômes : apparition de lésions au niveau des zones de contact avec les animaux *(cou, visage, avant-bras),* anneaux rougeâtres qui démangent
Charbon bactéridien	Bactérie : *Bacillus anthracis*	Contamination par contact cutané avec des animaux vivants ou morts ou inhalation de spores	• Durée d'incubation : 2 à 5 jours • Symptômes : forme cutanée dans 90% des cas *(escarre noirâtre)*, forme digestive avec des douleurs abdominales ou forme respiratoire avec évolution rapide et grave
Fièvre Q	Bactérie : *Coxiella Burnetti*	Contamination par inhalation	• Durée d'incubation : 2 à 3 semaines • Symptômes : syndrome grippal, complications possibles chez les sujets à risques
Brucellose	Bactérie : *Brucella abortus bovis*	Contamination par contact cutané avec les animaux malades ou par ingestion de produits laitiers ou de viande crue	• Durée d'incubation : 1 à 4 semaines • Symptômes : fièvres, courbatures, sueurs abondantes
Listériose	Bactérie : *Listeria monocy-togenes*	Contamination par contact cutané lors d'avortement ou de mise-bas	• Durée d'incubation : 3 à 70 jours, 3 semaines en moyenne • Symptômes : fièvre, fatigue, très rarement des lésions cutanées, risque d'avortement chez la femme enceinte
Salmonellose	Bactérie : *Salmonella typhimurium, enteritidis*	Contamination par contact mains-bouche avec les élements souillés	• Durée d'incubation : 1 semaine • Symptômes : fièvre, douleurs abdominales, diarrhée, forme grave chez les personnes immuno déprimées
Tuberculose bovine	Bactérie : *Mycobacterium bovis*	Contamination par inhalation en respirant des aérosols	• Durée d'incubation : variable • Symptômes : possibilité de fièvre modérée, fatigue générale, amaigrissement et symptômes qui dépendent de la localisation infectieuse
Encéphalopathie Spongiforme Bovine	Protéine prion	Contamination par plaie avec outil souillé par des substances nerveuses contaminées *(moelle épinière, nerf…)*	• Durée d'incubation : plusieurs années • Symptômes : troubles de l'équilibre et de la sensibilité, puis démence et décès au bout d'un an

Très fréquent
Fréquent
Rare
Théorique